

Bài viết tuyên truyền

Long Thành, ngày 15 tháng 6 năm 2021

Những điều cần biết sau khi tiêm chủng vaccin phòng Covid -19

1. Theo dõi sức khỏe bản thân sau khi tiêm chủng:

- Ở lại điểm tiêm chủng 30 phút sau khi tiêm để được cán bộ y tế theo dõi, phát hiện sớm các phản ứng sau tiêm chủng.

- Khi về nhà, nơi làm việc: chủ động theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 3 tuần sau tiêm. Đặc biệt trong vòng 24h đầu sau tiêm, không nên ở nhà một mình không có người thân theo dõi.

2. Bạn có thể gặp một số dấu hiệu thông thường sau khi tiêm vắc xin phòng Covid -19 như:

- Sốt, mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh.

- Đau cơ, đau khớp, tăng cảm giác đau.

- Ngứa, sưng, đỏ, đau tại chỗ tiêm, bần chôn,...

Đây là các phản ứng thông thường sau khi tiêm vắc xin phòng Covid -19, cho biết cơ thể bạn đang tạo miễn dịch phòng bệnh Covid -19.

3. Các phản ứng nghiêm trọng sau khi tiêm vắc xin phòng covid -19 là hiếm gặp:

- Dấu hiệu nghiêm trọng: Xuất hiện trong vòng vài giờ hoặc ngày đầu sau khi tiêm vắc xin phòng Covid -19

+ Ở miệng: ngứa, sưng môi hoặc lưỡi...

+ Ở da: phát ban, môi mẩn đỏ, tím tái hoặc đỏ da...

+ Ở họng: ngứa, căng cứng, tắc nghẹn, khản đặc...

+ Đường tiêu hóa: nôn, tiêu chảy, đau quặn bụng...

+ Đường hô hấp: thở dốc, thở khò khè, thở rít, khó thở, cảm giác nghẹt thở, ho....

+ Toàn thân: mạch yếu, chóng mặt, choáng/xây xẩm, cảm giác muốn ngã, chân tay co quắp...

- Dấu hiệu thông thường diễn biến nặng lên:

- + Sốt cao trên 39⁰C
- + Sưng/đỏ lan rộng tại chỗ tiêm, đau cơ dữ dội.
- + Tăng huyết áp hoặc tụt huyết áp hoặc kẹt huyết áp...

Sau khi tiêm vắc xin phòng Covid -19 nếu bạn gặp phải các dấu hiệu nghiêm trọng hoặc bất thường nêu trên hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và xử lý kịp thời.

Tiêm vắc xin phòng Covid -19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng./. *h*

Nơi nhận:

- Phòng VH-TT.
- Trung tâm VH-TT-TT huyện;
- 14 TYT xã, tt;
- Lưu: VT, P.KH-NV.



Nguyễn Thi Văn Văn