

Long Thành, ngày 25 tháng 10 năm 2022

Bài viết tuyên truyền

**Triển khai tiêm vắc xin bại liệt IPV mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi
trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR)**

Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm đầu mối thực hiện được triển khai ở Việt Nam từ năm 1981 có mục tiêu cung cấp dịch vụ tiêm chủng miễn phí cho trẻ em dưới 1 tuổi, bảo vệ trẻ khỏi một số bệnh truyền nhiễm phổ biến và gây tử vong cao, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe trẻ em. Hiện nay, đã có 11 loại vắc xin được đưa vào Chương trình, trong đó có vắc xin bại liệt.

Từ trước đến nay, lịch uống và tiêm vắc xin bại liệt của chương trình TCMR là uống 3 liều vắc xin bại liệt (OPV) vào thời điểm trẻ 2, 3 và 4 tháng tuổi, khi trẻ 5 tháng tuổi sẽ tiêm 1 mũi vắc xin bại liệt (IPV).

Việc triển khai tiêm vắc xin IPV liều thứ 2 được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị nhằm tạo sự bảo vệ cao hơn đối với bại liệt typ 2. Để thực hiện khuyến cáo của WHO, đồng thời bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt ở Việt Nam, Bộ Y tế đã gửi hồ sơ đề xuất Liên minh toàn cầu vắc xin và tiêm chủng (GAVI) hỗ trợ triển khai tiêm mũi 2 vắc xin IPV cho trẻ dưới 1 tuổi trên toàn quốc và được GAVI chấp thuận. Ngày 23/06/2021, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 3018/QĐ-BYT về việc phê duyệt dự án “Triển khai vắc xin bại liệt tiêm (IPV) mũi 2 trong tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2022”.

Vắc xin IPV mũi 2 đã được Bộ Y tế triển khai quy mô nhỏ tại 7 tỉnh đại diện cho 4 khu vực trong tháng 8/2022, kết quả cho thấy việc triển khai vắc xin IPV mũi 2 trong buổi tiêm chủng thường xuyên cùng với vắc xin khác là khả thi, thuận tiện được các bà mẹ chấp thuận, vắc xin IPV an toàn, có thể tiêm IPV2 với vắc xin sởi trong cùng buổi tiêm chủng. Phản ứng sau tiêm vắc xin IPV mũi 2 ghi nhận là phản ứng thông thường, không có trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Căn cứ vào kết quả trên việc tiêm vắc xin IPV mũi 2 quy mô toàn quốc sẽ được triển khai từ tháng 10/2022.

Lịch tiêm chủng vắc xin IPV:

- IPV1 vào lúc trẻ 5 tháng tuổi.
- IPV2 vào lúc 9 tháng tuổi. Trường hợp trẻ tiêm IPV1 muộn thì phải đảm bảo khoảng cách tiêm IPV mũi 2 ít nhất 1 tháng sau IPV mũi 1.

Sau tiêm các mẹ theo dõi trẻ trong vòng 30 phút tại cơ sở y tế nơi trẻ được tiêm và tại nhà ít nhất 24 giờ sau tiêm. Dưa trẻ đến ngay cơ sở y tế nếu sau khi tiêm chủng trẻ có dấu hiệu bất thường như sốt cao $\geq 39^{\circ}\text{C}$, quấy khóc kéo dài, tím tái, khó thở.v.v.

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh huyện (phát thanh);
- Trạm Y tế xã, thị trấn (tuyên truyền);
- Lưu VT, KHNV, KSBT.

Thông qua TTYT

KT.GIÁM ĐỐC



Người viết

Đào Minh Nguyệt

BSCKI Phạm Thành Hải